



こどもクリニックニュース

NO. 280 令和5年5月1日発行
ともながこどもクリニック

院長の予定 (2023年6月まで)

5月	10日	(水)	内科健診	水深幼
			3・9ヶ月健診	大利根・健康福祉センター
	12日	(金)	3ヶ月健診	加須・保健センター
6月	17日	(水)	内科健診	水深小
	2日	(金)	3ヶ月健診	加須・保健センター
			内科健診	にしき保育所 AM
	21日	(水)	内科健診	第4保育所 AM
1才半健診			加須・保健センター	

これらの日は午前の受付を12:00前に締め切ることがあります。また午後の診療開始時間が多少遅れることがあります。

※新型コロナウイルス感染症の流行状況等により、日程の変更があるかもしれません。

夏季休診の予定

8月20日(日)～27日(日)

小児科休日診療の当番

令和5年8月までの当番一覧です。

加須市では、11月～3月は元日を除くすべての日曜日に、4月～10月は祝日に小児科休日診療を行っています。

5月	3日	(水)	加藤こどもC
	4日	(木)	加藤こどもC
	5日	(金)	ともながこどもC
7月	17日	(月)	加藤こどもC
8月	11日	(金)	つのだ小児科医院

※診療(受付)時間は12:00までです。

当番は変わることがありますので、ご利用の際は加須市の広報誌やホームページで最新情報をご確認ください。

感染症の情報

3年ぶりに流行したインフルエンザは、危惧したほどの規模にはならず、当地区ではほぼ収束しました。

それ以外の主要な感染症も、今のところ目立った流行はありません。

発熱外来は継続します

(小児限定・完全予約制)

5月8日以降、新型コロナは5類感染症となる事が決定しました。季節性インフルエンザと同等の分類となるわけですが、新型コロナ感染者もしくはその疑いのある方は引き続き、一般の来院者とは待合室や診察室を分離するよう指針が示されました。

そういえば、麻疹や風疹、水痘なども「5類感染症」ですが、今までも隔離して診療していましたので、新型コロナもまだまだ慎重に対応する必要があるとの判断なのでしょう。発熱外来はこれまでと同様に継続します。

発熱のある方は受診前に電話連絡をお願いします。

<当院の発熱外来の対象>

- ① 38.0℃以上の熱がある方(概ね24時間以内)
- ② 37.0℃台の微熱でも、家族や身近に新型コロナ陽性者がいる方(いわゆる濃厚接触者)
- ③ 発熱の無い「濃厚接触者」

※注: それ以外の方は全員、通常診療です。

<検査対象>

上記①②に該当する方は検査対象といたします。

原則として、抗原定性検査キットを使用します。

※注: 上記③に該当する方は検査しません。



3歳までのお子様のワクチン接種・・・

私のおすすめパターン

ワクチンデビューは生後2ヶ月！

4月から四種混合ワクチンの初回接種月齢が生後2ヶ月からとなりましたので、お勧めパターンを改正しました。いくつかのバリエーションも併せて紹介します。

ワクチン接種の基本は、対象年齢になったら早めに開始すること。当院では、早く免疫を作るために「同時接種」をおすすめしていますが、単独接種でも対応可能です。

- ① 生後2ヶ月の誕生日が来たら
ロタ、ヒブ、肺炎球菌、四種混合、B型肝炎の1回目
- ② その後4週以上過ぎたら、上記5種類の2回目
★当院採用のロタワクチン（ロタリックス）はこれで完了
- ③ さらに4週間過ぎたら、ヒブ・肺炎球菌・四種混合の3回目
(ロタリックスの場合は、ここで3回目)
- ④ 生後5ヶ月になったら、BCGを接種
★急ぐ場合は、上記③と同時の接種も可能
- ⑤ 生後8ヶ月頃にB型肝炎（追加）を接種
(1回目から20週間以上、かつ1歳未満)

- ⑥ 1歳になったら
麻疹・風疹混合（MR）、水痘の1回目およびヒブ、肺炎球菌（追加）を接種
※※おたふくかぜワクチン（有料）もお勧め

- ⑦ 1歳半過ぎた頃
水痘2回目と四種混合/追加を接種
※※四種混合の追加接種の標準時期は、3回目から1年～1年半後とされていますが、
★急ぐ場合は、上記⑥と同時の接種も可能
ただし3回目から6ヶ月以上過ぎている事

- ⑧ 3歳になったら日本脳炎を開始

- ⑨ インフルエンザ（有料）は毎年接種する。（年末までに2回接種するのが理想的）



★ロタワクチンについて

ロタワクチンは2種類の製剤（商品）があり、有効成分や接種回数異なります。効果はほぼ同等ですが、混ぜこぜにせず、どちらか一方で接種を完了します。当院では「ロタリックス」という2回接種のワクチンを採用しています。

★BCGワクチンについて

結核予防のワクチンですが、定期接種は1歳未満、標準的には生後5～7ヶ月とされています。地域や家庭での結核流行等の事情があれば5カ月未満での接種も可能です。（自治体により異なることがあります）

★四種混合ワクチンについて

全部で4回の接種です。初回接種は生後2ヶ月から、3週間以上の間隔をあけて3回。追加接種は3回目の接種から最低6カ月以上、標準的には12～18ヶ月あけて1回です。



スギとヒノキの花粉飛散は終了

今シーズンは当初の予想通り大量の花粉が飛散したようで、花粉症デビューと思われるお子様も多かった印象です。

これからの季節はシラカバやブナの木の間が花を咲かせます。雑草（とりわけイネ科）の花粉飛散も多くなります。晴れて風の強い日は要注意です。

処方箋のFAX送信サービスは終了しました。

当院のホームページ

<http://tomonaga-kodomoc.jp>



と
も
な
が
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ック

加須市下高柳 1633-1

TEL 0480-66-4150