


こどもクリニックニュース

NO. 156 平成 25 年 1 月 4 日発行
ともながこどもクリニック



休診の予定

3 月末までは、臨時の休診の予定はありません。
水曜日は一日休診です。

小児科休日診療の予定

加須市では、11 月から翌年 3 月まで、元日を除く日曜・祝日に小児科休日診療が実施されています。2 月 11 日までの当番は以下のとおりです。

平成 25 年 1 月

日にち	曜日	当番医
6 日	(日)	中田病院
13 日	(日)	つのだ小児科医院
14 日	(月)	福島小児科医院
20 日	(日)	中田病院
27 日	(日)	加藤こどもC

平成 25 年 2 月

日にち	曜日	当番医
3 日	(日)	福島小児科医院
10 日	(日)	つのだ小児科医院
11 日	(月)	ともながこどもC

診療（受付）は 9:00~12:00 です。

医療機関の都合により当番が変更される場合があります。ご利用の際は、加須市の広報誌やホームページなどで、最新情報をご確認ください。

感染症の情報

インフルエンザの患者さんは、11 月下旬から少しずつ見られるようになり、12 月後半から明らかに増加してきました。12 月には加須市内の一部の学校で学級閉鎖もありました。流行が拡大しそうな時に学校が冬休みに入りましたので、大流行にはならず済みそうですが、これから全国的に人の移動がありますので、年明けはいつどこで流行しても不思議ではありません。

予防対策として、こまめに手洗いをすること、周囲の方へうつさないために、熱や咳が出ている方はマスクを着用を心がけてください。

胃腸炎症状の方は引き続き多いです。また RS ウィルス感染症の報告も多い状態が続いています。水痘や溶連菌感染症も見られます。

手洗いは、すべての感染症の予防にとっても有効です。

インフルエンザの出席停止期間の変更

インフルエンザにかかった時、学校は出席停止になりますが、登校できる基準が変わりました。

発病後（最初の症状が出てから）5 日以上経過し、さらに熱が下がって 48 時間（2 日間）過ぎていたら登校して良い、というのが新しい基準です。

なお、幼稚園や保育園の登園許可基準は「発病後 5 日以上、解熱後 3 日」です。解熱後の日数に、違いがありますのでご注意ください。

院長の予定（2013 年 3 月まで）

1 月	16 日	(水)	2才健診	保健センター
2 月	13 日	(水)	2才健診	保健センター
3 月	1 日	(金)	3ヶ月健診	保健センター

これらの日は午前の受付を 12:00 前に締め切ることがあります。また午後の診療開始時間が多少遅れることがあります。

四種混合ワクチンについて

11月1日から、三種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンが合わさった「四種混合ワクチン」が使用できるようになりました。2種類の注射が1回で済むため、とっても嬉しいことなのですが、発売後2ヶ月過ぎた今でも、ワクチンの供給量が十分ではありません。

発売前からの情報で、今年の8月以降に生まれた赤ちゃんに接種することができるギリギリの量しかないと、全国レベルでは今年度中の必要量は供給できるということでした。ただし少ないことはどうしようもないので、これまでに生まれた赤ちゃんの人数に基づき、各県ごとに販売量が決められているということでした。しかし年末の段階では、当院には希望される方の必要量が届きませんでした。おまけにメーカーから出荷・配送される日にちも、直前になるまで確定しないため、お子様に接種するスケジュールを立てる（お約束する）ことができませんでした。

やむを得ず、ご希望の方はとりあえず「お申し込み」いただいております。ワクチンが手元に届いてから接種日をご相談させていただいております。生後3ヶ月になったら接種可能なワクチンなのですが、当院の現状では、接種開始が生後4カ月前後になってしまうこともあります。

この年頃の赤ちゃんは、これ以外にもヒブや肺炎球菌ワクチン、BCG、また自費ではありますがロタワクチン、B型肝炎ワクチンなど、接種できるワクチンがたくさんあります。2種類以上のワクチンの同時接種でも構わないという方であれば、それらのワクチン接種を計画しておいて、四種混合ワクチンは、確保できた時点で追加して接種を行うというやりかたをお勧めしています。

・・・その場合に多少問題となるロタワクチン・・・

ロタワクチンは「生ワクチン」なので、接種後4週間は他のワクチンが接種できなくなります。当院で採用しているロタワクチンは、生後24週までに合計2回の接種が必要です。ロタワクチンは生後6週から接種できるワクチンですが、実際には生後2ヶ月台でヒブ・肺炎球菌ワクチンと同時接種で開始される方が多いです。その場合、2回目接種は4週後、多くの場合生後3ヶ月台ということになり、このときに四種混合ワクチンの1回目を加えるのが（私の）理想なのですが、前述の理由でワクチンが間に合わない可能性があります。その場合、四種混合ワクチンを接種できる時期は、早くても2回目のロタワクチンから4週間以上過ぎてから（おおむね生後4ヶ月頃）ということになります。

四種混合ワクチンの成分の中で、赤ちゃんに早く接種したいのは「百日咳菌」に対する成分です。これは従来の「三種混合ワクチン」に含まれているため、「三種混合＋不活化ポリオワクチン」を使った接種も認められています。三種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンは十分ありますので、この2つのワクチン使用でもOKという方は、三種混合＋不活化ポリオの組み合わせもご検討ください。



ワクチンの公費（無料）接種には「期限」があります。
とりわけ・・・

- 中学1年生と高校3年生の方へ
麻しん・風しんワクチンは接種しましたか？
- 子宮頸がんワクチンの公費接種は中学1年から高校1年までです。合計3回の接種が必要ですので、お忘れになりませんように。

こどもクリニックニュースの
無料郵送サービスをしています！

郵送をご希望の方は、受付でお申し込み下さい

携帯用ホームページ

ともながこどもクリニック

加須市下高柳1633-1

TEL0480-66-4150